

**#MODELĂM
VIITORUL
ÎMPREUNĂ**



Bolnav la grădiniță Kita și la școală?

Reglementarea frecvențării grădiniței
Kita și școlii în cazul bolilor contagioase
Statut: mai 2025

„Când se poate întoarce copilul meu la grădiniță Kita/școală? Nu mai este bolnav.”

Dragi părinți,

Este adesea dificil să se decidă când un copil se poate întoarce la grădiniță Kita sau la școală după o boală. Cu toate acestea, există linii directe pentru acest lucru.

În general, copiii nu au voie să meargă la grădiniță Kita sau la școală dacă au o boală infecțioasă. Ca părinți, trebuie, de asemenea, să informați grădinița Kita sau școala cu privire la natura bolii.

Această broșură informativă vă oferă un tabel cu privire la reglementările din Legea privind protecția împotriva infecțiilor (§ 34). Grădinița Kita sau școala v-a informat cu privire la aceste reglementări atunci când copilul dvs. a fost admis și ați semnat documentul „Instrucțiuni pentru tutorii legali”.

Prin contactul strâns, agenții patogeni se răspândesc ușor în grădinițe Kita și școli. Scopul Legii privind protecția împotriva infecțiilor este de a reduce riscul de infecție pentru alți copii, membri ai familiei, îngrijitori și profesori.

Bolile enumerate pot fi deosebit de grave și pot duce la complicații și leziuni permanente sau se pot răspândi foarte ușor. Prin respectarea orientărilor, este posibil să se limiteze sau să se prevină complet răspândirea bolilor.

Vă rugăm să consultați tabelul pentru a afla când se poate întoarce copilul dvs. la grădiniță sau la școală după o boală.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

Pentru a oferi bolilor infecțioase cât mai puțin „spațiu de manevră” posibil, este important ca toți cei implicați să colaboreze.


Pentru mai multe informații privind bolile individuale




[infektionsschutz.de](https://www.infektionsschutz.de)



[bioeg.de](https://www.bioeg.de)



[impfen-info.de](https://www.impfen-info.de)



[hygiene-tipps-fuer-kids.de](https://www.hygiene-tipps-fuer-kids.de)

Boala	Perioada de incubație	Re-autorizarea persoanei bolnave	Măsuri speciale
Conjunctivită severă cauzată de adenovirusuri	5 – 12 zile	14 zile de la debutul bolii; numai pentru adenovirusuri!	Spălarea frecventă a mâinilor; Evitați contactul cu ochii; Spălătorie $\geq 60^{\circ}\text{C}$
Lichen de scoarță (Impetigo contagiosa)	1 – 3 zile	24 de ore de la începerea antibioterapiei, altfel după vindecare	Spălarea frecventă a mâinilor; Spălătorie $\geq 60^{\circ}\text{C}$
Răceli cu febră ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) (de asemenea, gripă, RSV, SARS-CoV-2)	1 – 12 zile (în funcție de agentul patogen)	Min. 24h fără febră, îmbunătățire semnificativă a stării generale	Spălarea frecventă a mâinilor; Ventilare frecventă; eticheta tusei
Mână-picior-gură	3 – 10 zile	După incrustarea completă a veziculelor	Spălarea frecventă a mâinilor
Herpes	2 – 12 zile	Nu se exclude riscul de contagiozitate	Evitați să atingeți leziunile, dacă este posibil
Tuse convulsivă (pertussis)	în general 9 – 10 zile (interval 6 – 20 de zile)	5 zile de la începerea antibioterapiei sau 21 de zile de la începerea tusei dacă nu a fost efectuat niciun tratament antibiotic	Vaccinare!
Păduchi de cap	Fără perioadă de incubare	Posibil după primul tratament	Al doilea tratament după 8 zile, pieptănarea cu un pieptene pentru nituri
Râie (Scabie)	Simptome după 2 – 5 săptămâni, în caz de reinfecție după 1 – 4 zile	8 ore după primul tratament cu cremă sau 24 de ore după administrarea comprimatelor	Tratarea simultană a tuturor membrilor familiei; în cazul scabiei crustate, consultarea Autorității sanitare.
Boli gastrointestinale (de asemenea norovirusuri/rotavirusuri, salmonella)	1 – 3 zile mai mult dacă este necesar	Fără vărsături sau diaree timp de 48 de ore la copiii sub 6 ani	Vaccinare (rotavirus); Igiena produselor alimentare; Spălarea frecventă a mâinilor; Spălătorie / vase $\geq 60^{\circ}\text{C}$
Rujeola	7 – 21 zile	În a cincea zi de la apariția exantemului	Vaccinare! Persoanele care au intrat în contact cu bolnavul sunt informate de Autoritatea sanitară.
Meningococcus	3 – 4 zile (interval 2 – 10 de zile)	24 de ore de la începerea antibioterapiei	Vaccinare! Persoanele care au intrat în contact cu bolnavul sunt informate de Autoritatea sanitară.
Oreion	16 – 18 zile (interval 12 – 25 de zile)	5 zile de la debutul simptomelor	Vaccinare! Persoanele care au intrat în contact cu bolnavul sunt informate de Autoritatea sanitară.
Febra glandulară fluierătoare	1 – 6 săptămâni	Nu se exclude în principiu riscul de contagiozitate; Vizită în funcție de starea generală	O singură infecție oferă protecție pe viață
Erupții cutanate	1 – 2 săptămâni	Dacă apare erupția cutanată	O singură infecție oferă protecție pe viață
Rubeola	14 – 17 zile (interval 14 – 21 de zile)	După recuperare și la cel mult 8 zile de la debut	Vaccinare! Persoanele care au intrat în contact cu bolnavul sunt informate de Autoritatea sanitară.
Scarlatină sau alte streptococi	1 – 3 zile	24 de ore după începerea terapiei cu antibiotice și ameliorarea simptomelor, în caz contrar 24 de ore după recuperare	Spălarea frecventă a mâinilor; Veselă $\geq 60^{\circ}\text{C}$
Varicela	14 – 16 zile (interval 8 – 28 de zile)	După incrustarea completă a veziculelor	Vaccinare! Persoanele care au intrat în contact cu bolnavul sunt informate de Autoritatea sanitară.
Bolile viermilor		Fără excludere	Spălarea frecventă a mâinilor; Taiăți unghiile scurt; Spălătorie $\geq 60^{\circ}\text{C}$

Ca regulă generală: copiii care sunt grav bolnavi (febră $\geq 38^{\circ}\text{C}$, epuizare) nu au ce căuta în creșă sau la școală

Informații suplimentare pot fi găsite aici:

Centrul federal pentru educația în domeniul sănătății

www.infektionsschutz.de

www.bioeg.de

www.impfen-info.de

Spitalul Universitar din Bonn

Institutul pentru Igienă și Sănătate Publică

www.hygiene-tipps-fuer-kids.de

StädteRegion Aachen

Consiliul regiunii urbane
A 53 | Autoritatea sanitară
52090 Aachen

Telefon
E-Mail

+ 49 241 5198 5300

infektionsschutz@staedteregion-aachen.de

Adresă Internet staedteregion-aachen.de

Mai multe informații pe

